




©Mayo Foundation for Medical Education and Research. All rights reserved.

**Диференцијална дијагноза на "црвено око":**

**1. CONJUNCTIVITIS**

**2.IRIDOCYCLITIS**

**3. Akuten GLAUCOM**

**4. Flash - eye - после заварување**

**CONJUNCTIVITIS:**

**а). КОНЈУНКТИВАЛНА ВАСКУЛАРИЗАЦИЈА**
**б).РЕАКЦИЈА НА ПУПИЛА СОЧУВАНА**
**в).СОЛЗЕЊЕ, ФОТОФОБИЈА, ЧЕШАЊЕ,**
**г). НЕМА БОЛКА**
**д). ВИД СОЧУВАН**

**IRIDOCYCLITIS**

**а). МЕШОВИТА ВАСКУЛАРИЗАЦИЈА - со доминација на цилијарна инјекција околу лимбусот на рожницата**
**б). МИОТИЧНА И НЕПРАВИЛНА зеница - со изгубена реакција на светло**
**в).ОСЛАБЕН ВИД**
**г).ИМА БОЛКА( послаба отколку кај глаукомот).**

# АКУТЕН GLAUCOM

**а). ЦИЛИЈАРНА ВАСКУЛАРИЗАЦИЈА**
**б). Поплитка предна комора**
**в). Заматена корнеа (едем на корнеа)**
**г).ПРОШИРЕНА ПУПИЛА**
**д). ЈАКИ И ИЗНЕНАДНИ БОЛКИ**
**ѓ). НАМАЛЕН ВИД**

# ХРОНИЧЕН GLAUCOM

**а). НЕМА ЦРВЕНИЛО**
**б). НЕМА БОЛКА**
**г). ПОКАЧЕН очен притисок (кој не мора да го чувствува)**
**д). ГЛАУКОМАТОЗНА ЕКСКАВАЦИЈА на папила**
**ѓ). ГУБЕЊЕ НА ВИДОТ**

**ХИПЕРТОНИЧНО ОЧНО ДНО**

**Стадиуми:**

**I ANGIOPATHIA HYPERTONICA**
**- вазоспазам на артериоли**
**- GUNN- SALUSOV феномен:**
**Gunn-Salus 1 артеријата лесно ја натиснува вената**
**Gunn-Salus 2 под притисок вената лачно се изместува**
**Gunn-Salus 3 притисокот е толку голем што се има впечаток дека вената е сосем прекината**

**II ANGIOSCLEROSIS RETINAE HYPERTONICA**
**- трајни оштетувања на артериоли- симптом на "сребрена жица"**
**- периваскуларни хеморагии- почеток на дегенеративни промени на ретина**

**III RETINOPATHIA HYPERTONICA**
**- хеморагични изливи во ретина**
**- " сивкасти"- меки ексудати- реверзибилни**
**-"бели"-тврди ексудати-дегенеративни иреверзибилни промени на ретина**
**-ОШТЕТЕН ВИД**

**ДИАБЕТИЧНО ОЧНО ДНО**
**I RETINOPATHIA DIABETICA NON PROLIFERATIVA:**

**1.ANGIOPATHIA DIABETICA**
**-микроаневризми**
**-предилекционо место -макула.**
**- се открива само со fluoresceinska angiografija.**
**-на ретината не се гледаат промени**

**2. RETINOPATHIA DIABETICA**
**-микроаневризми**
**-парамакуларно се појавуваат "бели петна" на дегенеративни промени и точкасти крварења**
**-НА РЕТИНА СЕ ГЛЕДААТ ПРОМЕНИТЕ**

# II RETINOPATHIA DIABETICA PROLIFERATIVA

**1.RETINOPATHIA DIABETICA PROLIFERANS**
**- сите претходни знаци**
**- ОБИЛНИ РЕТИНАЛНИ КРВАРЕЊА**
**-НАМАЛЕН ЦЕНТРАЛЕН И ПЕРИФЕРЕН ВИД**

**2.RETINOPATHIA DIABETICA COMPLICATA**
**- тракциона аблација**
**- пролиферација на сврзно ткиво во стаклесто ткиво со неоваскуларизација**
**-секундарен glaucom**
**- диабетична katarakta**
**-СЛЕПИЛО**

**Овие стадиуми се прелеваат еден во друг и не одат паралелно по интензитет на двете очи. Еволуцијата на диабетичната retinopathia нема строги критериуми и не е во директна зависност од процентот на шеќерот во крвта.**

# Chalazion




# Subconjunktivalna hemorrhagia




# uveitis




# Divergenten strabizam




Koja патолошка состојба  е на слајдот?




# Ставање на капки во око





# Неоваскуларизација



# Normalen vid





Myopia


Cataract


Glaucoma


Diabetic Retinopathy


Age-related Macular Degeneration


Retinitis Pigmentosa